



ميدىكلينىك
مستشفى المدينة

ميدىكلينىك **بيبي** مخاطر استخدام اللهايات وزجاجات الرضاعة مع الحلماى

**يوصى بتجنب استخدام اللهايات وزجاجات الرضاعة مع الحلماى
حتى نجاح عملية الرضاعة الطبيعية (من 4 إلى 6 أسابيع بعد الولادة)
للأسباب الآتية:**

- سيرضع طفلك بشكل مختلف عن الرضاعة الطبيعية
- قد يجد الأطفال الذين يستخدمون الحلماى صعوبة فى تذكر كيفية الرضاعة من الثدي
- قد يآثر فى كمية إدرار حليب الأم
- بإمكانها نقل الجراثيم
- بإمكانها التأثير على طريقة نمو فم الطفل

تعتبر تغذية الطفل بالكوب طريقة بديلة لإطعام الطفل خلال الأسابيع الأولى.



MEDICLINIC baby

RISKS OF USING PACIFIERS AND FEEDING BOTTLES WITH TEATS

It is recommended to avoid using pacifiers and feeding bottles with teats until the successful establishment of breast feeding (4 to 6 weeks after birth) because:

- Your baby sucks differently to breastfeed than to bottlefeed
- Babies who use teats may find it difficult to remember how to attach to the breast
- They may interfere with the mother milk supply
- They can carry infection
- Baby's oral formation can be affected

**CUP FEEDING CAN BE AN ALTERNATIVE WAY TO FEED
YOUR BABY IN THE EARLY WEEKS.**

