


شارع خليفة، بالقرب نت بنك أبو ظبي الوطني  
ص.ب. ٤٦٧١٣، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة  
ت: +٩٧١ ٢٦٢٦٥٢٦٥  
ف: +٩٧١ ٢٦٢٦٤٤٤

KHALIFA STREET, NEXT TO THE NATIONAL  
BANK OF ABU DHABI (NBAD)  
P.O. BOX 46713, ABU DHABI UAE  
T: +971 2 626 5265  
F: +971 2 626 4440

alnoorhospital@mediclinic.ae  
www.mediclinic.ae



EXPERTISE YOU CAN TRUST.


UAE • SOUTH AFRICA • NAMIBIA • SWITZERLAND  
www.mediclinic.ae

MANH.COM.BABY.7.0

**MEDICLINIC**  
AL NOOR HOSPITAL

**MEDICLINIC** baby

# الختان CIRCUMCISION



## Circumcision is the surgical removal of the foreskin for religious and medical reasons.

- For babies under two month of age, circumcision can be done under local anaesthesia. For older babies, it has to done under general anaesthesia
- There is no need for the baby to fast if the procedure is under local anaesthesia
- The admission office will arrange a time for admission. The patient will be guided to the ward where the family will stay during the procedure
- Under local anaesthetic the excess foreskin is removed. A plastic ring will be left to guard the head of the penis
- The main complication associated with circumcision is bleeding. This is controlled by haemostatic agent or by stitches after removing the foreskin
- There will be some pain. This can be managed mainly by breast feeding and helped by Adol suppositories
- Antibiotic cream is applied over the plastic ring twice daily for seven days
- Most plastics ring separate within five to nine days. The skin distal to it usually swells before the separation and comes away within 10 days. If the ring does no separate, it can be removed as an outpatient procedure

## الختان هو إستئصال جراحي للقلفة الزائدة لأسباب دينية و طبية.

- للأطفال تحت شهرين ويتم الإجراء تحت التخدير الموضعي، أو للأطفال الأكبر سناً تحت التخدير الكلي.
- لا داعي لصيام الطفل إذا كان الإجراء الجراحي تحت التخدير الموضعي.
- سيحدد موعد الإجراء الجراحي من قبل مكتب الدخول بالمستشفى وستوجه لمكان الإنتظار إلى حين الإنتهاء من الإجراء الجراحي.
- تحت التخدير الموضعي سيتم إزالة القلفة الزائدة (الختان) وسوف تترك حلقة من البلاستيك لحماية رأس القطيب.
- المضاعفات الرئيسية بعد الختان هو النزيف ولكن يسيطر عليه بعمل غرزة بعد إزالة القلفة.
- سيكون هناك بعض الألم نتيجة إجراء الختان ولكن يزول بالرضاعة الطبيعية وإعطاء أدول تحاميل
- يُنصح بوضع كريم مضاد حيوي على الحلقة البلاستيكية مرتين يومياً لمدة ٧ أيام
- تنفصل (تسقط) الحلقة البلاستيكية من الجلد طلقائياً خلال ٥ - ٩ أيام ، غالباً ما تورم أو يتضخم الجلد حول الحلقة قبل الفصل ولكنها تنفصل (تسقط) خلال ١٠ أيام، وإذا لم تنفصل الحلقة يتم فصلها بواسطة الطبيب في العيادات الخارجية